Detección de COVID-19

Todas las mañanas, antes de enviar a su(s) estudiante(s) a la escuela, marque lo siguiente:

Si respondió "sí" a cualquiera de estas preguntas, NO envíe a su(s) estudiante(s) a la escuela. En su lugar, consulte la Guía de regreso a la escuela de su escuela o comuníquese con la escuela de su hijo/a. Considere seriamente realizar pruebas de COVID-19 si aún no lo ha hecho.

1 ¿Su hijo/a ha experimentado alguno de los siguientes síntomas desde la última vez que asistió a la escuela?:

SÍNTOMAS de COVID-19



Tos *Dificultad para respirar* *Fiebre* *Dolor de Cabesa* *Dolor muscular o cuerpo* *Escalofríos*

Dolor de garganta *Congestión o secreción nasal* *Pérdida de sabor u olfato* *vómitos nauseas* *Fatiga* *Diarrea*

2 ¿Su hijo/a dio positivo para COVID-19 en los últimos 10 días O está esperando los resultados de la prueba?

3 ¿Su hijo/a ha estado en contacto cercano (a menos de 6 pies durante más de 15 minutos) o ha vivido con alguien confirmado con COVID-19 en los últimos 14 días?

bfhd.wa.gov/covid19

PUBLIC HEALTH
Prevent • Promote • Protect
BENTON-FRANKLIN HEALTH DISTRICT

COVID-19 Orientación para el regreso a la escuelab

Situación	Puede regresar a la escuela
❑ Contacto cercano con caso positive o caso probable	**Si está sintomático (con resultado de prueba negativo o sin prueba) o si no puede adherirse al uso de mascarilla/distanciamiento al regresar a la escuela** • 14 días después del último contacto con un caso positivo **Y** • 10 días después que comenzaron los síntomas **Y** • Tiene al menos 24 horas sin fiebre (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) **Y** • Otros síntomas han mejorado. **Si no tiene síntomas y puede adherirse al uso de mascarilla/distanciamiento al regresar a la escuela** • Si han pasado al menos 10 días después del último contacto con el caso positivo; o a los 7 días, con un resultado negativo de una prueba realizada hasta 48 horas antes del regreso. (Esto puede omitirse para los empleados esenciales.)
❑ Prueba COVID-19 positiva	**Sintomático** • 10 días después de que comenzaron los síntomas **Y** • Al menos 24 horas sin fiebre (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) **Y** • Otros síntomas han mejorado. **No síntomas** • 10 días después de la fecha de recolección de la prueba.
❑ Cualquier Síntoma de Clase A. ❑ 2 o más Síntomas de Clase B de cualquier duración. ❑ 1 o más Síntomas de Clase B que duran más de 24 horas. **Y** Sin exposición conocida o Contacto Cercano	**Con resultado negativo de la prueba COVID-19 de y/o diagnostico alternativo del proveedor de salud que explica todos los síntomas** • 24 horas sin fiebre (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) Y • Otros síntomas han mejorado **O** • Por condición diagnosticada por el proveedor de salud (la que tiene más larga plazo). **Sin prueba COVID-19 o diagnóstico del proveedor de salud** • 10 días después de que comenzaron los síntomas **Y** • 24 horas sin fiebre (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) **Y** • Otros síntomas han mejorado.
❑ 1 Síntoma de Clase B que resuelve en 24 horas **Y** Sin Exposición Conocida o Contacto Cercano	• 24 horas sin fiebre (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) **Y** • Otros síntomas han mejorado.
❑ Esperando el resultado de la prueba COVID-19	Quédese en casa mientras espera los resultados de la prueba, y luego siga las instrucciones que correspondan revisadas anteriormente.

Síntomas compatibles con COVID-19 (no relacionado con una condición preexistente)

Síntomas de Clase A
- Fiebre (100.4 o más)
- Tos
- Perdida de sabor u olfato
- Falta de aliento o dificultad para respirar

Síntomas de Clase B
- Fatiga
- Dolor de cabeza
- Dolores musculares o corporales
- Dolor de garganta
- Congestión o secreción nasal
- Nauseas o vómitos
- Diarrea (2 o más deposiciones blandas en 24 horas)

Contacto Cercano: Individuos que hayan estado a 6 pies o menos de distancia durante 15 minutos o más, acumulados en un período de 24 horas, a un caso confirmado que esté en su período contagioso.

Casos Probable: Síntomas y contacto cercan o con caso positive

Periodo infeccioso: comienza 48 horas antes delo inicio de los síntomas

Diagnostico alternativo: diagnostico confirmado por laboratorio, como faringitis estreptocócica o patógeno viral. También puede incluir enfermedad de erupción infantil, otitis media aguda, etc. (la prueba COVID-19 aún se recomienda encarecidamente en adición.)

Referencias: WA DOH, CDC

Actualizado: 5/3/21